DOS CALCIDOIDEOS NUEVOS PARA LA FAUNA DE ARGENTINA Y PARAGUAY (HYMENOPTERA: ENCYRTIDAE Y EURYTOMIDAE)

En la presente nota se cita una especie de Encyrtidae nueva para la fauna de Argentina y una especie de Eurytomidae nueva para la fauna de Paraguay. Los materiales estudiados pertenecen en el primer caso a la Colección Instituto-Fundación Miguel Lillo de Tucumán y en el segundo caso a la Colección del entomólogo M. Fritz, de Salta.

Para la determinación del encírtido se utilizó la clave de Noyes (1980) y para la identificación del euritómido la clave de Burks (1971).

ENCYRTIDAE

Género *Anusioptera* Brues

Anusioptera Brues, 1910, p. 83.

Especie tipo: *Anusioptera aureocincta* Brues, 1910

Anusioptera aureocincta Brues

Anusioptera aureocincta Brues, 1910, p. 83.

Anusioptera aureocincta; De Santis, 1979, p. 188; Noyes, 1980, p. 175.

Distribución geográfica: México y hay que agregar ahora Argentina.

Observaciones: El género *Anusioptera* presenta una distribución discontinua dentro de la región neotropical ya que se encuentra en México y en Argentina, la única especie que posee hasta el momento. Los materiales argentinos provienen de muestras colectadas con trampa Malaise en la zona "Subandina". Según Noyes (1980) son probablemente parasitoides de homópteros de la familia Pseudococcidae.

Material Estudiado: 2 hembras ARGENTINA, Catamarca, Los Nacimientos. VIII/IX-1969. Willink, Terán y Stange (T. Malaise).

continúa en la página 162

EURYTOMIDAE

Género *Striateurytoma* Burks

Striateurytoma Burks, 1971, p. 70

Especie tipo: *Bephrata striatipes* Ashmead, 1904.

Striateurytoma striatipes (Ashmead)

Bephrata striatipes Ashmead, 1904, p. 462.

Bephratoides striatipes; Gahan, 1951, p. 173.

Striateurytoma striatipes; Burks, 1971, p. 71; De Santis, 1979, p. 80; De Santis, 1980, p. 243; De Santis, 1981, p. 5.

Distribución geográfica: Brasil, Trinidad y hay que agregar ahora Paraguay.

Observaciones: El género *Striateurytoma* posee una sola especie y hasta el momento únicamente presente en la región neotropical. Según datos del Catálogo de De Santis (1979) ha sido obtenida de semillas de "soursop"

Material estudiado: 1 hembra, PARAGUAY, Cororo, río Ypane. M. Fritz.

REFERENCIAS

ASHMEAD, W.H., 1904. *Mem. Carneg. Mus.*, 1 (4):255-555.
BRUES, CH.T., 1910. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, 28:79-85.
BURKS, B.D., 1971. *Trans. Amer. Ent. Soc.*, 97 (1):1-89.
DE SANTIS, L., 1979. *Publ. esp. Com. Invest. Cient. Prov. Buenos Aires*: 1-488.
------ 1980. *Ed. Univ. Fed. Par.*, Curitiba, Brasil:1-395.
------ 1981. *Rev. peru. Ent.*, 24 (1):1-38.
GAHAN, A.B., 1951. *Can. Ent.*, 83:171-176.
NOYES, J.S., 1980. *Bull. Br. Mus. (Nat. Hist.)*, 41 (3):107-253.

Patricio FIDALGO
Instituto-Fundación Miguel Lillo
Tucumán